



BROTACIÓN      CRECIMIENTO VEGETATIVO      FLORACIÓN      CUAJADO      CRECIMIENTO DE FRUTO      MADURACIÓN

FENOLOGÍA	PRODUCTOS	DOSIS	APLICACIÓN	OBJETIVO
BROTACIÓN	humistar plus® ●	12 L / ha	Fraccionar la dosis total en 3 aplicaciones de 4L/ha, con una frecuencia de 15 días entre aplicaciones	Mejorar la estructura del suelo, asimilación de nutrientes. Favorecer el desarrollo radicular
	phylgreen® ●	0.5 L / 200L	1 a 2 aplicaciones con frecuencia de 7 a 10 días	Promover una estructura vegetativa equilibrada, e inducir una óptima floración.
CRECIMIENTO VEGETATIVO	fertifulvat ●	28 L / ha	Fraccionar la dosis total en 3 aplicaciones de 9L/ha (última de 10L/ha), con una frecuencia de 15 días entre aplicaciones, desde inicio de floración	Mejorar la estructura del suelo, asimilación de nutrientes. Favorecer el desarrollo radicular
	ruter AA® ●	8 L / ha	Alternar la aplicación de ruter AA con la anterior, y fraccionarla en 2 de 4 L/ha, distanciadas 15 días entre aplicación	Favorecer el desarrollo radicular y la absorción de nutrientes
	tradecorp® Zn ●	150 g / 200L	Aplicación semanal desde prefloración hasta fruto tamaño aceituna. No aplicar en conjunto con otros quelatos.	Complementar la nutrición de microelementos, favorecer un óptimo desarrollo floral y de fruto
	tradecorp® Mn ●	150 g / 200L	Aplicación semanal desde prefloración hasta fruto tamaño aceituna. No aplicar en conjunto con otros quelatos.	Complementar la nutrición de microelementos, favorecer un óptimo desarrollo floral y de fruto
	tradecorp® AZ ●	150 g / 200L	Aplicación semanal desde prefloración hasta fruto tamaño aceituna. No aplicar en conjunto con otros quelatos.	Complementar la nutrición de microelementos, favorecer un óptimo desarrollo floral y de fruto
FLORACIÓN Y CUAJADO	ultraferro® ●	150 g / 200L	Aplicación semanal desde prefloración hasta fruto tamaño aceituna. No aplicar en conjunto con otros quelatos.	Complementar la nutrición de microelementos, favorecer un óptimo desarrollo floral y de fruto
	tradebor® ●	0.5 L / 200L	1 aplicación	Asegurar una efectiva polinización. Evitar caída de flor y frutos; complementar nutrición cálcica.
	amino CaB® ●	0.8 L / 200L	2 aplicaciones : 1era en cuajado, 2da: durante crecimiento de fruto	
	fertitec® flash ●	0.5 L / 200L	1 aplicación	Disminuir la caída de frutos por árbol; ayudar a superar situaciones de estrés.
	delfan plus® ●	0.5 L / 200L	1 aplicación	Favorecer un mayor desarrollo celular en frutos, y lograr así frutos de mayor tamaño. Tolerar y superar situaciones de estrés.
CRECIMIENTO DE FRUTO	fertitec® gel PK ●	1 L / 200L	2 aplicaciones : 1era junto con 2da aplicación de Amino CaB (fruto tamaño aceituna); 2da: 15 días después	
	aminofert K ●	0.5 - 0.8 L / 200L	1 aplicación durante el llenado de fruto ("engorde")	Disminuir la caída de frutos por árbol; ayudar a superar situaciones de estrés.
MADURACIÓN	Phylgreen® B Mo ●	0.5 L / 200L	2 aplicaciones; 1era: en última fase de engorde de fruto (cambio de color); 2da: postcosecha	

● APLICACIÓN FERTIRRIEGO      ● APLICACIÓN FOLIAR