

aminofert K




Formulación altamente concentrada en potasio con aminoácidos

- El potasio es uno de los elementos mas importantes en la nutrición de las plantas pues está implicado en la acumulación de hidratos de carbono y grasas en los frutos, así como en los procesos de transpiración, movimientos de agua en la planta y en la regulación de la apertura y cierre de los estomas.
- Asegura mayor rapidez de absorción y eficacia.
- Por otro lado el fósforo juega un papel esencial en todos los procesos que requieren transferencia de energía (ATP)
- Fundamental en la formación y desarrollo de las semillas; y por ende en el desarrollo de los frutos.

Av. Nicolás Arriola 314 Of. D-101
Urb. Sta. Catalina - La Victoria
Lima - Perú
Telf.: 511-223 2023
Móvil: 943 660 801
servicioalcliente@fertitec.com.pe
ventas@fertitec.com.pe



PROGRAMA NUTRICIONAL ARANDANOS



APLICACIONES VÍA FERTIRIEGO		DOSIS x 200 L	APLICACIÓN	OBJETIVO
POST COSECHA BROTACIÓN	Ruter AA [®]	8 L / ha	• Realizar 2 aplicaciones distanciadas 15 días	Promover el desarrollo radicular y lograr un óptimo establecimiento del cultivo
DURANTE TODO EL CICLO DEL CULTIVO	Tradecorp [®] AZ	4,0 kg / ha	• Aplicar cada 15 días la dosis en dosis de 0,4 kg/ha	Promover los elementos necesarios para que la planta tenga una nutrición balanceada y adecuada. Prevenir deficiencias nutricionales
	Tradecorp [®] Mn	3 kg / ha	• Aplicar durante 7 semanas en dosis de 0,3 kg/ha, alternando con Tradecorp AZ	
	Fertifulvat [®]	35 L / ha	• Aplicar durante 7 semanas en dosis de 5 L/ha, a partir de yema abierta	Acidificación de agua de riego
	Lower 7 [®]		• Titular el agua a pH 4 - 5, y definir la dosis por m ³ de agua	
POST COSECHA	Trafos K [®]	4 L / ha		
COSECHA	Ruter AA [®]		• Aplicar a la mitad del periodo de cosecha	Fomentar la protección natural de las plantas
APLICACIONES EN SUELO		DOSIS x 200 L	APLICACIÓN	OBJETIVO
POST COSECHA	Trafos B-Mo	500 ml	• Realizar 2 aplicaciones; 1ra, durante las últimas cosechas; 2da, a penas concluida la cosecha	Promover la traslocación de fotosintatos hacia zonas de reserva
DESARROLLO VEGETATIVO	Delfan [®] Plus	500 ml	• Realizar 2 aplicaciones distanciadas de 12 a 15 días entre si	Promover un desarrollo vegetativo
FLORACIÓN CUAJADO	Systacal Plus	500 ml	• Realizar aplicaciones distanciadas de 12 a 15 días entre si	Promover un desarrollo equilibrado del cultivo, previniendo deficiencias de la Ca.
DESARROLLO DE FRUTO	Phylgreen [®] Aminofert K	500 ml 1 L	• Aplicar durante estos estadios con distanciamiento de 15 entre aplicaciones	Promover el óptimo desarrollo de fruto y calidad del mismo
PINTA - COSECHA	Aminofert K Maxflow [®] Mg Maxflow [®] Ca	750 ml 500 ml 500 ml	• Alternar las aplicaciones cada 10 a 15 días	Promover el óptimo desarrollo de fruto y calidad del mismo

COMENTARIOS:

* Lea la etiqueta antes de usar el producto.